



## PPID (Ziekte van Cushing) bij paarden

We zien regelmatig paarden en pony's met PPID, ook wel bekend als 'de ziekte van Cushing'. PPID staat voor pars pituitary dysfunction, of te wel een niet goed functionerende hypofyse. De hypofyse is een klein kliertje dat hormonen produceert in de hersenen (o.a. ACTH). Bij paarden met PPID is de productie van ACTH ontregeld, er wordt daardoor te veel ACTH geproduceerd. PPID komt voor bij wat oudere dieren, meestal vanaf een jaar of 15 en heeft verschillende symptomen.

### Symptomen

Met name in het najaar stijgt het ACTH gehalte van paarden en pony's met PPID flink. In het najaar is het onderscheid tussen wel of geen PPID dan ook het beste te meten.

Heeft uw paard (een van) deze symptomen?

- Verminderd presteren
- Gedragsverandering
- Vertraagde verharding, te lange en/of krullerige vacht
- Regelmatig hoefbevangen
- Veranderde lichaamsbouw
- Vetophoping (boven de ogen)
- Lusteloos

Dan kan uw paard PPID (ziekte van Cushing) hebben.

### PPID test

Van **1 september t/m 31 oktober 2019** kunt u uw paard of pony laten testen door middel van een ACTH test. De ACTH test wordt in september en oktober aangeboden met 50% korting.

### Behandeling

PPID is goed te behandelen met Prascend. Als de diagnose van PPID is bevestigd dan kan er gelijk gestart worden met de behandeling. Afhankelijk van het gewicht van het paard of pony wordt gestart er met een half tot een heel tablet per dag. Vervolgens moet er 4 tot 6 weken daarna de ACTH waarde opnieuw gemeten worden, om te kijken of de dosering goed is voor het paard of pony.

Paard met PPID voor de behandeling



Hetzelfde paard 4 maanden na de behandeling



Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen via 0593- 33 12 53.